Protocol vitaal bedreigde neonaat

MKA

Melding prehospitale neonaat in (mogelijk) levensgevaar

2 ambulances en MMT naar adres sturen

SEH dichtstbijzijnde* ziekenhuis alarmeren

I.g.v. Prematuur <32 weken: heeft dichtstbijzijnde ziekenhuis NICU?

Ja

Nee

NICU transport-team oproepen om naar ziekenhuis te komen

Afschalen:
- NICU transportteam annuleren
- SEH informeren

* Tenzij dit ziekenhuis heeft aangegeven geen neonaten op te vangen, dan geldt: eerstvolgende dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Ambulance / MMT

Aankomst op locatie van melding

Vitaal bedreigd en/of prematuur?

Ja

Nee

LPA / protocol MMT**

ZSM transport naar dichtstbijzijnde gekwalificeerde ziekenhuis (ziekenhuis met verloskunde en kinderafdeling)

AMB contact opnemen met meldkamer

Overleg met verloskundige / huisarts / kinderarts over vervolgstappen

**** NB: het heeft GEEN prioriteit i.v. of i.o. toegang te verkrijgen!**

Ziekenhuis

Bedreigde Neonatale Functies:

- Prematuur <32 weken
- Geen of insufficiente ademhaling
- Slap en/of niet reactief
- Ernstige en/of persisterende (>1 uur) bleekheid/ cyanose
- Hartactie persisterend >160/min of <100/min

*NB: Bij twijfel over conditie van de neonaat maar geen duidelijke tekenen van levensbedreigende situatie laagdrempelig overleggen met de kinderarts van het **DICHTSTBIJZIJNDE** ziekenhuis.*

Melding vitaal bedreigde neonaat

Komst neonaat op SEH voorbereiden:
- Kinderarts oproepen om direct naar SEH te komen
- Baby-reanimatietafel en benodigdheden klaarzetten
- Kamer voorverwarmen (deuren dicht!)

NB kinderarts en opvangruimte / materiaal zijn binnen 15 min. paraat!

Overdragen patient op shockroom SEH

- Opvangen neonaat
- Kinderarts overlegt (zo nodig) met NICU

Belangrijk: alle gegevens apart bewaren en z.s.m. aanmelden voor perinatale audit.

Flowchart 'Protocol Vitaal Bedreigde Neonaat' V1.0 - Behorende bij Protocol 'Prehospitale Acute Verwijzingen' V1.0