

Inzetcriteria cardiologische patiënten MCA Ambulance Amsterdam

MCA en ALS

Patiënten met NSTEMI <u>na</u> PCI (CABG)		Patiënten met 3-vats lijden en/of hoofdstamstenose (vastgesteld bij CAG)		Patiënten na een electieve CAG / PCI / FFR	
ALS ✓ Alleen bij gecompliceerde PCI	MCA ✓ In alle overige gevallen	ALS ✓ <24 uur	MCA ✓ >24 uur stabiel en klachtenvrij	ALS ✓ Bij gecompliceerd verloop	MCA ✓ Bij ongecompliceerd verloop
Patiënten na een ongecompliceerde CABG		Patiënten na plaatsen interne pacemaker		Patiënten na een ICD-implementatie (primair en secundair)	
ALS ✓ <24 uur	MCA ✓ >24 uur	ALS ✗	MCA ✓ Altijd	ALS ✗	MCA ✓ Altijd
Patiënten met STEMI na primaire PCI		Patiënten met STEMI <u>voor</u> primaire PCI (CABG)		Patiënten na TAVI	
ALS ✓ <24 uur na diagnose	MCA ✓ >24 uur stabiel en klachtenvrij	ALS ✓ <24 uur na diagnose	MCA ✓ >24 uur stabiel en klachtenvrij	ALS ✓ Alle overige gevallen	MCA ✓ Ongecompliceerd, onveranderd ECG en geen externe pacemaker

Alleen ALS

Patiënten met STEMI		Patiënten na een externe pacemaker		Patiënten met een tweede en derdegraads AV-block	
ALS ✓ Via de meldkamer	MCA ✗	ALS ✓ Altijd	MCA ✗	ALS ✓ Altijd	MCA ✗

